

03 IN smertebehandling med Fentanyl

Kun trinn 3.

Indikasjoner:

Smertestillende behandling ved skader hvor pasienten ikke har intravenøs tilgang. Frakturer, dislokasjoner, brannskader eller andre skadesmerter.

Kontraindikasjoner:

Skader i nese/kraftig neseblødning. Kjent overfølsomhet mot opiater. Graviditet.

Forsiktighet:

Forsiktighet til pasienter med respirasjons-insuffisiens, koronarsykdom, akutt abdomen, ruset pasient, nedsatt bevissthet, hodeskade.

Medikament:

Fentanyl 50 mikrogram (μg)/ml

Administrering/Dosering:

IN (Intranasalt)

Dosering barn:

Første dose 1,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IN (fordeles i begge nesebor 0,25 – 0,5 ml).

Andre dose kan gis etter 10 minutter ved behov.

Ved ytterligere behov for smertestillende, vurder Ketamin IN (konferer AMK lege)

Dosering voksne:

Første dose 1,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IN (fordeles i begge nesebor 0,25 – 0,5 ml)

Andre dose kan gis etter 10 minutter ved behov.

Ved ytterligere behov for smertestillende, vurder Ketamin IN (konferer AMK lege)

[Doseringsskjema til barn over 15 kg.](#) [Doseringsskjema til voksne.](#)

Bivirkninger:

Kvalme/brekninger/oppkast, hypotensjon, hypertensjon, bradykardi og sedasjon.

Konsultasjon:

Konferer med AMK lege ved barn under 30 kg.

Ved ytterligere behov for smertestillende, vurder Ketamin IN (konferer AMK lege)

Merknad:

Behandling av Fentanyl overdose:

Oksygen, assistert ventilasjon ved behov, Nalokson ved respirasjonssvikt (konferer med AMK lege hvis du har tid)